

## Lunette afocale

---


On considère une lunette afocale formée des éléments optiques suivants,

- Un objectif de focale 800 mm et de diamètre 80 mm assimilé à une lentille mince convergente
- Un oculaire de focale 80 mm et de diamètre 30 mm assimilé à une lentille mince convergente

1. Faire un schéma de principe de la lunette et écrire les conjugaisons.
2. Déterminez la distance entre l'objectif et l'oculaire.
3. Exprimer la taille de l'image intermédiaire fournie par l'objectif d'un objet vu à l'infini sous un angle  $\theta$ , puis exprimer l'angle  $\theta'$  sous lequel est vue l'image intermédiaire à travers l'oculaire. En déduire une expression du grossissement de la lunette.
4. Sur l'annexe (échelle transversale  $\times 2$  et longitudinale  $\times 1/4$ ) faire un schéma de la lunette complète et tracer deux rayons, provenant d'un point objet à l'infini sur l'axe, qui s'appuient sur les bords de l'objectif et qui traversent toute la lunette.
5. Déterminer la position et le diamètre de la pupille d'entrée de la lunette.
6. Déterminer la position et le diamètre de la pupille de sortie. La positionner sur le schéma. Que constatez-vous par rapport à votre tracé de la question 4.
7. Trouver une relation entre le grossissement de la lunette et les diamètres des pupilles d'entrée et de sortie.
8. Vérifier la relation précédente avec une vraie paire de jumelles fournie par votre enseignant·e.

CORRECTION


1.  $\infty \xrightarrow{\text{objectif}} F'_{\text{objectif}} = F_{\text{oculaire}} \xrightarrow{\text{oculaire}} \infty$



2.  $d_{\text{obj-oc}} = f'_{\text{obj}} + f'_{\text{oc}} = 880\text{mm}$

3.  $y' = f'_{\text{obj}} \times \theta$  ;  $G = \frac{\theta'}{\theta} = \frac{-y'/f'_{\text{oc}}}{y'/f'_{\text{obj}}} = -\frac{f'_{\text{obj}}}{f'_{\text{oc}}} = -10$

4. Schéma  
OBJECTIF



5. L'élément qui limite l'ouverture des faisceaux est ici l'objectif car il est l'élément vu sous le plus petit angle du point image en Foc dans l'espace intermédiaire. L'objectif est donc également la pupille d'entrée.


6. La pupille de sortie est l'image de la pupille d'entrée par tout le système, i.e. l'image de l'objectif par l'oculaire. Soit la conjugaison suivante,

$$\overline{F_{oc}Pe} \times \overline{F'_{oc}Ps} = \overline{F_{oc}O_{obj}} \times \overline{F'_{oc}Ps} = -f'^2_{\text{oculaire}}$$

ce qui donne  $\overline{F'_{oc}Ps} = \frac{-80^2}{-800} = +8\text{ mm}$ .


La taille de Ps utilise (par exemple) la formule du grandissement au centre, soit,

$$\phi_{PS} = \phi_{DO} \times \frac{\overline{O_{oc}Ps}}{\overline{O_{oc}Pe}} = 80 \times \frac{80 + 8}{800 + 80} = 8\text{ mm}$$



7. En utilisant le rayon qui part du bord de PE et qui va jusqu'au bord de PS, on a simplement la relation suivante (triangles semblables),

$$\frac{\phi_{PS}}{\phi_{PE}} = \frac{f'_{oc}}{f'_{obj}} = \frac{1}{G}$$



8. Le grossissement est mentionné sur la monture. Pour voir la pupille de sortie, portez à bout de bras les jumelles et orientées les vers la lumière. Faites la mise au point sur l'oculaire. Vous verrez facilement un petit disque lumineux « flotté » devant l'oculaire. C'est la pupille de sortie (l'entonnoir de sortie, image de l'entonnoir d'entrée qui est ici l'objectif). Dans l'image ci-dessous, je mesure un diamètre de 4 mm pour PS et 32 mm pour PE (c'est également mentionné sur la monture). On retrouve donc bien un grossissement de 8.



↔  
~ 4 mm